

Регіональна анестезія для позапланового кесарського розтину



Regional anaesthetic for unplanned Caesarean Sections (CS) – information card

Інформаційна листівка.

Регіональна анестезія (епідуральна чи спінальна) це тип полегшення болю де вам надають ін'єкцію місцевої анестезії в поясницю щоб повністю викликати оніміння починаючи з грудей і до ніг. Ваші ноги також оніміють і ви не зможете ними рухати. Повного ефекту анестезія набирає через 10-20 хвилин.

Налаштування анестезії (Setting up the anaesthetic)

Вам спочатку підведуть крапельницю через голку під назвою внутрівенна канюля в руку або ногу.

Анестезист введе укол місцевого анестетика в вашу поясницю. Вам введуть трубку під назвою катетер в пустий сечовий міхур. Ваш тиск і рівні кисню будуть часто перевірятись.

Деякі лікарні дозволять батьку дитини бути з вами підчас процедури, але деякі дозволять йому ввійти лише після.

Переваги регіональної анестезії (Advantages of a regional anaesthetic)

Це часто найбезпечніший вибір якщо ви потребуєте невідкладний кесарський розтин.

Вона дає можливість не спати під час народження дитини і полегшення болю після регіональної анестезії зазвичай кращий ніж після загальної анестезії.

Можливі проблеми регіональної анестезії (Possible problems with a regional anaesthetic)

Анестезист перевірить що ви повністю зацілювали перед тим як почати операцію. Перевірка не дає 100% гарантії і можуть бути неприємні відчуття під час операції.

Є звичайним відчуття рухів і поштовхів в середині вашого живота, але вас це не має вас тривожити. Інколи можлива легка біль яку можна полегшити обезболюючими які ви приймете через крапельницю або маску чи мундштук.

Рідко ви можете відчути сильну біль. Якщо це станеться анестезист може надати загальну обезболення дуже швидко. Ви заснете.

Є звичайним зниження тиску крові цим анестетиком. Також може викликати тошноту і стан непритомності. Твій анестезіолог допоможе тобі пролікувати цей стан відразу при появі симптомів. Для попередження симптомів медикаменти інколи дають з премедикацією.

**Ризики і побічні дії регіональної анестезії
(Risks and side effects of regional anaesthetic)**

Можливі проблеми	Як часто трапляється
Свербіння	Часто : 1 з 3-10 людей в залежності від медикамента і дози
Значне зниження <i>артеріального тиску</i>	спінальна: поширено, 1 з 5 епідуральна: рідко, 1 з 50
Епідуральна надана під час пологів виявилась неефективною для поповнення, інший анестетик потребується для кесарського розтину	Поширено: 1 з 8-10
Недостатній ефект анестезії, потребуються додаткові медикаменти для подолання болі під час операції.	Спінальна: Рідко- 1 з 20 Епідуральна: Поширено- 1 з 7

Недостатній ефект регіональної анестезії для кесарського розтину необхідна загальна анестезія.	Спінальна: Рідко- 1 з 50 Епідуральна: Рідко- 1-20
Сильна головна біль	Спінальна: 1 з 500 Епідуральна: 1 з 100
Нервові пошкодження	Ефект триває менше ніж 6 місяців(наприклад :онеміння частини ноги чи стопи, слабкість в нозі): досить рідко- 1 з 1000 до 2000. Ефект триває більше ніж 6 місяців: рідко 1 з 24 000
<p>Менінгіт</p> <p>Абсцеси (інфекція) в хребті в районі спінальної чи епідуральної ін'єкції.</p> <p>Гематома в хребті в районі ін'єкції.</p> <p>Абсцес чи гематома що привела до серйозного ускладнення, включаючи параліч (параплегія).</p> <p>Велика кількість місцевого з епідуральною анестетика випадково введено в вену в хребті.</p>	<p>Рідко 1 з 100 000</p> <p>Рідко 1 з 50 000</p> <p>Рідко 1 з 168 000</p> <p>Рідко 1 з 100 000</p> <p>Рідко 1 з 100 000</p>

<p>Велика кількість місцевого обезболюючого випадково введено в спинномозкову рідину, що може бути причиною важкого дихання і дуже рідко- втрати свідомості.</p>	<p>Рідко 1 з 2</p>
--	--------------------

Точна цифра невідома для всіх узкладнень.
Якщо Ви маєте запитання ,будь ласка, запитуйте свого анестезіолога.

Ви можете знайти більше інформації на вебсайті Роял Коллеж Анестезіологов www.rcoa.co.uk. Лестівка має назву " Anaesthesia for Caesarian section. "



© Obstetric Anaesthetists' Association 2012

Registered Charity No 1111382

www.oaafornthers.info