

دوران زچگی بے ہوشی کا انجکشن – آپ کو کیا کچھ معلوم ہونا چاہیئے

یہ ایک خلاصہ ہے۔ یہ مکمل معلومات ہے زچگی میں درد سے نجات سیکشن برائے مہربانی اپنے بے ہوش کرنے والے کے ساتھ ہر اس بات پر تبادلہ خیال کر لیں جو کہ آپ کو واضح نہیں ہے۔

بے ہوشی کا انجکشن دینے کا طریقہ کار

- آپ کو ایک رگ میں دیئے جانے والے کینولہ اور شاید ایک ڈرپ کی ضرورت ہوگی۔
- جب نشے کا انجکشن لگایا یا ڈال دیا جاتا ہے ، تو یہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ اپنے اینسٹھی سٹ کو جو کہ آپ کے پاس موجود ہو گا اسے ضرور بتائیں کہ اگر آپ اپنے کو محسوس کریں سکڑاؤ
- عام طور پر بے ہوشی کے انجکشن کے طریقہ کار کو مرتب کرنے کے لیے 20 منٹ اور کام شروع کرنے میں 20 منٹ لگتے ہیں۔
- کچھ نشے کے انجکشنز مکمل طور پر کام نہیں کرتے اور ایپی ڈیورلز مکمل طور پر کام نہیں کرتے اور انہیں ٹھیک یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

## بے ہوشی کے انجکشن کے فوائد

- عام طور پر درد سے نجات میں بہترین مدد فراہم کرتا ہے ۔
- بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی میں فوری اثر کے لئے دیا جاتا ہے۔
- بعض اوقات مقامی بے ہوشی کے انجکشن کی خوراک یا قسم بھی آپ کو بستر کے ارد گرد پھرنے کی اجازت دے سکتی ہیں۔ یہ ایک کم خوراک (یا موبائل) بے ہوشی کا انجکشن ہے۔
- عام طور پر بے ہوشی کا انجکشن آپکے بچے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔
- جب بھی ضرورت ہو آپ کو سیڈیرین کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔

## آپ کے ایپی ڈیورل کے ساتھ ممکنہ مسائل

- بار بار مضبوط مقامی بے ہوشی کے انجکشن عارضی طور پر ٹانگ کی کمزوری اور خطرے میں اضافے کی وجہ بن سکتے ہیں پیدائش کے دوران جراحی کا چمٹا یا نچوڑنے والی ٹوپی۔
- بے ہوشی کا انجکشن زچگی کے دوسرے مرحلے کو تھوڑا سا سست کر سکتا ہے۔
- آپ کو بے ہوشی کے انجکشن کے دوران کم بلڈ پریشر، خارش یا بخار ہو سکتا ہے۔
- بے ہوشی کے انجکشن کی جگہ کچھ دنوں کے لیے نرم ہو سکتی ہے۔ کمر کا درد بے ہوشی کے انجکشن کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کسی بھی حمل کے بعد عام ہے ۔

## زچگی کا درد کم کرنے کے لیے ایپی ڈیورل اور سپائنل لینے کا خطرہ

خطرے کی نوعیت	یہ کتنی کثرت سے ہوتا ہے؟	یہ کتنا عام ہے؟
فشار خون میں نمایاں کمی	ہر 50 خواتین میں سے کسی ایک کو	کبھی کبھار
یہ زچگی کے درد کو کم کرنے کے لیے ناکافی ہوتا ہے پس آپکو درد کو کم کرنے کے لیے دوسرے طریقوں کی ضرورت ہوگی۔	ہر 8 خواتین میں سے کسی ایک کو	عام
سیزیئیرین سیکشن کے لیے ناکافی ہو گا پس آپ کو ایک عمومی بے ہوشی کے انجکشن کی ضرورت ہو گی	ہر 20 خواتین میں سے کسی ایک کو	کبھی کبھی
سر میں شدید درد	ہر 100 خواتین میں سے کسی ایک کو (بے ہوشی کے انجکشن کے دوران) ہر 500 خواتین میں سے کسی ایک کو(ریڑھ کی ہڈی کے دوران)	غیر معمولی
اعصابی نقصان (پیر یا ٹانگ پر غیر محسوساتی جگہ، یا ایک کمزور ٹانگ)	ہر 1000 خواتین میں سے عارضی طور ایک	نایاب
6 ماہ سے زائد دیرپا اثرات	ہر 13,000 خواتین میں مستقل طور پر ایک	نایاب
بے ہوشی کے انجکشن کی جگہ پر پھوڑا (بیماری)	ہر 50000 خواتین میں سے کسی ایک کو	بہت نایاب
گردن توڑ بخار	ہر 100000 خواتین میں سے کسی ایک کو	بہت نایاب
بے ہوشی کے انجکشن کے دوران ہیماٹوما (خون جمنا)	ہر 170000 خواتین میں سے کسی ایک کو	بہت نایاب
حدثاتی لاشعوریت	ہر 100000 خواتین میں سے کسی ایک کو	بہت نایاب
مفلوج ہونے سمیت شدید زخمی	ہر 250000 خواتین میں سے کسی ایک کو	انتہائی نایاب

شائع شدہ دستاویزات سے دستیاب معلومات ان خطرات کے لیے درست اعداد و شمار نہیں فراہم کرتا۔ اوپر ظاہر کیے گئے اعداد و شمار تخمینے کے مطابق ہیں اور یہ مختلف ہسپتالوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔