

Pen tost/Cur Pen yn dilyn epidwral neu bigiad sbinol?

Yr hyn sydd angen ei wybod

Wedi derbyn epidwral neu bigiad sbinol, mae'r risg o ddatblygu "Pen tost/Cur Pen wedi pigiad dwral" rhwng 1 mewn 100 ac 1 mewn 200.

Beth sy'n achosi'r pen tost / cur pen?

Sach yn amgylchynu'r ymennydd a llinyn y cefn yw'r dwra. Gellir niweidio'r dwra yn ddamweiniol yn y weithred o roi epidwral, neu'n fwiadol wrth berfformio pigiad sbinol. O ganlyniad, gall hylif lifo drwy'r twll gan ostwng pwysedd yr hylif sy'n amgylchynu'r ymennydd ac achosi pen tost / cur pen.



Beth yw patsh gwaed?

(1) Mae patsh gwaed epidwral yn debyg i'r broses o berfformio epidwral neu bigiad sbinol ac fel arfer yn cael ei berfformio gan anesthydd yn un o'r ystafelloedd esgor neu'r theatr. Gan amlaf, rhaid aros o leiaf 24 awr wedi'r pigiad dwral cyn gwneud y patsh gwaed.








(2) Yn ystod y driniaeth caiff gwaed ei gymryd o wythïen yn y fraich.




Pa fath o ben tost / cur pen allaf ddisgwyl?

- Daw ymlaen ychydig o ddyddiau yn dilyn epidwral neu bigiad sbinol
- Yn aml yn ddirifol
- Yn waeth wrth eistedd ac yn well wrth orwedd
- Efallai bydd poen yn y gwddf
- Gall olau llachar fod yn anghyfforddus – gwell bod mewn ystafell dywyll

Beth yw'r driniaeth?

-  Gorffwys yn y gwely
-  Yfed digon o ddŵr a diodydd â chaffein (fel te, coffi, cola)
-  Cymryd moddion lleddfu poen (fel paracetamol a ibuprofen)
-  Amser (gall wella ar ôl ychydig o ddyddiau)
-  Patsh gwaed (os nad yw'n gwella neu'n ddirifol iawn)

(3) Chwistrellir y gwaed i'r gwagle epidwral.



(4) Gofynnir i chi orwedd i lawr am rai oriau yn dilyn y driniaeth i roi cyfle i'r gwaed geulo yn y man cywir. Wrth i'r gwaed geulo, mae'n selio'r twll a lleddfu'r pen tost / cur pen.



Beth yw sgil effeithiau patsh gwaed?

- Mewn 1 o bob 5 achos, nid yw'n lleddfu'r pen tost / cur pen
- Gall chwistrellu'r gwaed achosi poen cefn
- Gall y cefn fod yn boenus am rai diwrnodau
- Mae risg isel (1%) o achosi pigiad dwral arall
- Gall cymhlethdodau anghyffredin gynnwys haint, niwed nerfol neu waedu yn y cefn

Cysylltwch â'r ysbyty ar unwaith os ydych yn datblygu:

- Poen cefn dirifol
- Tymheredd uchel
- Pen tost / cur pen sy'n gwaethygu
- Gwddf stiff
- Gwendid yn y coesau
- Anymataliaeth wrin neu garthion

Am fwy o wybodaeth am Ben tost / Cur Pen wedi pigiad dwral, cysylltwch â gweithiwr iechyd proffesiynol. Cewch fwy o wybodaeth am opsiynau lleddfu poen ac anaesthetig tra'n feichiog ar wefan Labour Pains website - www.labourpains.com